

Belladonna - caz clinic*

Dr. Gheorghe Jurj

* *Revista Română de Homeopatie*, vol.1, 1999, 53-54

Cazurile clinice tratabile cu Belladonna sunt foarte frecvente. Din numeroasa cazuistică proprie a remediului am ales acest caz nu neapărat pentru că ar fi foarte dificil de diagnosticat remediul cât pentru faptul că l-am putut documenta paraclinic suficient de bine pentru a demonstra eficacitatea obiectivă a homeopatiei, chiar comparativ cu alopatia.

M.N., bărbat, 55 ani, internat într-o clinică universitară de boli interne cu diagnosticul: Microlitiază biliară. Sludge biliar. Hepatosteatoză. Status postpneumonie interstițială dr. Arteriopatie aterosclerotică a membrelor inf. gr.I/II. Nevralgie cervico-occipitală pe fond de insuficiență circulatorie vertebro-bazilară.

Motivele internării au fost: stare generală rea, dureri crampoide, foarte accentuate și paretezii la nivelul membrelor inferioare, subfebrilități cu transpirații profuze nocturne, cefalee occipitală cu debut în urmă cu 2 luni.

La data internării — 29 sept. 1998, prezenta următoarele date biologice:

-VSH 95mm/1h

-hiperalfa 2 14%

- puls diminuat la artera pedioasă și tibială posterioară (vezi oscilografia din data de 08. 09. 1998)

Nivelul	Piciorul stâng	Piciorul drept
femurală	1.5/2	1.5/2
poplitee	½	½
tibială	0.5/1	0.5/1

- adenopatie hilară stg. (pentru care se face bronhoscopie și probe ventilatorii — normale)

- sludge biliar — detectat echografic

Este considerat ca un Sindrom febril prelungit și tratat cu antiinflamatoare, colecistokinetic (anghirol), tonice hepatice, după care VSH-ul scade la 57 mm/1h, dar starea generală, cefaleea, și durerile membrelor inferioare persistă, motive pentru care se prezintă la consultul homeopatului.

La examenul obiectiv erau de remarcat:

- faciesul de aspect congestiv cu privire „strălucitoare”

- conjunctivită congestivă

- lipom mare (10/8cm) la nivelul brațului stâng

- zona de urgență a Nv. Arnoldt, sensibil la presiune

- vertij apărut la mișcările de rotație minime ale capului

Simptomele pe care pacientul le acuza erau:

- cefalee cu punct de pornire occipital, survenind în accese zilnice la mișcare (trebuie să oprească mașina sau să coboare din tramvai), la trezirea din somn, cu durate de 6-7 ore necedând la antalgicele obișnuite, cu caracter pulsatil, însoțite de transpirații reci și de o stare de amețeală categorisită de pacient „parcă aș fi fost beat, deși nu mai beau de 10 ani”

- dureri atroce în gambe ce apăreau la 100-150m de mers(claudicație intermitentă), dar și în repaus cu fasciculații și mult agravate de frig

- somn neliniștit, se trezește la orice zgomot

Cazul avea multe simptome de Belladonna și alura generală a remediului.

Problema cazului era nu atât a remediului homeopatic ci dacă acesta este de administrat în condițiile în care probele biologice arătau o alterare serioasă ce putea sugera diagnostice de gravitate. Totuși investigațiile de amănunt efectuate în clinică l-au infirmat, iar tratamentul alopatic administrat nu avut un rezultat satisfăcător.

Am administrat Belladonna C9 de 2ori pe zi.

La 2 săptămâni cefaleea s-a ameliorat net (70%), a dispărut conjunctivita (pentru care urmasse tratamente oftalmologice fără rezultat) și s-a ameliorat claudicația (peste 400m). VSH-ul era încă (22.10.1998) - 60/80mm.

Am păstrat același tratament, și simptomele au continuat să se amelioreze în totalitatea lor, pentru ca în 4.12.1998 VSH-ul să fie 3/5mm. L-am repetat a 2 zii la alt laborator cu același rezultat.

În 18.01.1999 la același oscilometru rezultatele au arătat o ameliorare spectaculoasă a perfuziei periferice.

Nivelul	Piciorul stâng	Piciorul drept
femurală	5	5
poplitee	3	4
tibială	3	3